


結核病皮膚測試

TB 是什麼？

“TB” 是一種叫做結核病的簡稱。

人們如何患上結核病？

結核是由一些很小的可以在空氣中漂浮的病菌所傳染。當結核病患者咳嗽、打噴嚏或大聲呼喊時，便會將這些病菌噴到空氣中。如果另一個人吸入這些病菌，便可能會患上結核病 (TB)。結核病會使人感到倦怠、發燒和盜汗。大多數人認為結核病只會影響人的肺部。在感染上結核病的人當中，70% 的人肺部都有這些病菌，但是結核病還會感染人體的其他部位，例如骨頭、大腦或腎。



如果我有結核病，我如何發現？

一種簡單的皮膚測試可以檢查出您的體內是否有結核菌。這種測試通常是在手臂上做的。用一根小針將測試液置入皮下。兩三天後，醫護人員將檢查針口處的反應情況。

測試後，我該如何保護自己的手臂？

- 切勿在針口上貼上止血貼或膠布。
- 切勿用手摩擦針口或搔癢。



如果我的結核病皮膚測試呈陰性，將會怎麼樣？

在大多數情況下，如果置入測試液的部位沒有腫起來，您可能沒有感染上結核病。

如果我的結核病皮膚測試呈陽性，將會怎麼樣？

測試結果為陽性時，手臂上測試的部位會腫起來。這意味著您的體內可能有結核菌。醫生可能需要做一些其他檢查來找出病菌是在體內的哪個部位。

對於醫生或護士來說，在測試後的 48-72 小時內檢查您的皮膚測試是非常重要的。

如果我已接種過卡介苗疫苗，將會怎麼樣？

即使您接種過卡介苗疫苗，您也可以做結核病皮膚測試。

- 已接種了卡介苗疫苗的人仍會感染結核菌。

好消息！

如果您知道自己感染了結核菌，您可以通過吃藥消除這些病菌來恢復健康。



BPHC, TB Clinic, BMC Yawkey Bldg. 3rd Floor
850 Harrison Ave.
Boston, MA 02118

電話：(617) 534-4967 (預約)
(617) 534-4875 (護士)

中文

2005 年 2 月更生